

# 國立成功大學醫學院附設醫院

## 美沙冬治療衛教

### 一、美沙冬治療方法

美沙冬是一種二級管制藥物，一般用於海洛因成癮者之解藥或維持療法，幫助成癮者減少渴癮及戒斷症狀的痛苦，以長效藥物代替短效毒品；美沙冬由口服吸收，一天服用一次即可。

### 二、美沙冬治療優點

- (1)減少海洛因與有害藥物使用。
- (2)降低經由血液傳染的疾病。
- (3)減輕戒斷症狀，改善生活功能。
- (4)降低的犯罪率。
- (5)增加就業率、提升經濟狀態。
- (6)改善與親友的關係與互動。

### 三、門診及服藥時間

(1)門診時間：

週一 13：30~17：00

週二、週四、週五 09：00~12：00

(2)服藥時間：

週一至週五：07：30~17：00

週六、日及國定假日：07：30~13：00

### 四、費用補助：

- (1)申請愛滋藥癮補助者(本人須持有全國醫療服務卡)，需付掛號費用為150元
- (2)申請台南市政府補助者，戶籍台南市居住超過6個月以上可申請，需付掛號費用為110元。
- (3)申請台南市衛生局補助，掛號費用為450元，檢查需自行付費。
- (4)服藥費用：自費40元、CDC補助20元、台南市政府補助40元、台南市衛生局補助35元。

### 五、替代治療服藥相關注意事項

- (1)治療期間請隨身攜帶附照片證件備查。
- (2)錯過調劑時間將無法取得美沙冬。
- (3)美沙冬是一種作用類似海洛因的口服二級管制藥品不可持有、轉讓、販賣。
- (4)美沙冬須在給藥人員目視下當場服下，並檢查口腔。
- (5)您如果有連續14天未能領取美沙冬，電腦系統將自動退出治療。

### 六、服用美沙冬應注意哪些事項

- (1)若出現走路搖晃、口齒不清、身體麻痺、嗜睡或意識不清、瞳孔縮小如針狀、呼吸不順、昏迷等中毒現象應立即送醫。
- (2)突然停止服用美沙冬可會產生顫抖、冒冷汗、流淚、流鼻水、坐立不安等戒斷症狀，因此若想停止服用美沙冬應與醫師討論慢慢降量，勿自行停藥。
- (3)接受美沙冬維持治療，若仍使用海洛因、酒精、安非他命或其他非法物質、安眠藥、

鎮定劑等其他藥物，至少間隔 6 小時才可服用美沙冬。

## 七、違反相關規範或出現非法行為的處置

如有以下情況，一律強迫終止治療

- (1) 攜帶武器，不論您是否有使用。
- (2) 暴力、威脅或騷擾工作人員或其他病人。
- (3) 破壞物品或偷走機構的東西。
- (4) 被發現並未真正吞服下美沙冬或企圖帶出美沙冬。
- (5) 被工作人員發現販賣毒品或疑似販賣毒品。
- (6) 被發現尿液掉包或一再拒絕接受尿液檢驗。
- (7) 滿14天未出席美沙冬治療。

國立成功大學醫學院附設醫院  
成癮戒治門診 關心您  
電話：06-2353535 分機 4362