

# 非鴉片類毒品衛教單

## 一、認識毒品

依據「毒品危害防制條例」第二條，毒品是指具有成癮性、濫用性及對社會危害性之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品。以下為我國毒品分類為二級之毒品。

名稱/俗名	使用方式	危害及戒斷症狀
安非他命、甲基安非他命 安仔 冰糖 冰毒 冰塊	口服 鼻吸 煙吸 注射	1. 精神方面：失眠、焦慮、易怒、情緒低落、記憶減退、幻覺、妄想、攻擊行為、自殺及殺人傾向，〈昂其使用會造成精神分裂症(思覺失調症)等。 2. 心血管：心跳加速、心悸、心律不整等。 3. 過量時會造成昏迷、體溫過高、橫紋肌溶解及急性腎衰竭，甚至導致死亡。 4. 戒斷症狀：沮喪、憂鬱、全身無力、焦慮易怒。
大麻/ 草、飯	口服 煙吸	1. 心跳加快、反應慢、妄想、幻覺、口乾、眼

麻仔 老鼠尾		睛發紅等，長期使用會造成記憶及學習、認知能力減退、體重增加、不孕症等。 2. 孕婦使用會造成胎兒腦部發育異常。 3. 戒斷症狀：易怒、躁動、憂鬱、食慾減退、失眠。
搖頭丸/ 快樂丸 綠蝴蝶 亞當 狂喜 忘我 衣服 夏娃	口服 (有不同顏色圖案之型態)	1. 食慾減退、噁心嘔吐、視力模糊、盜汗、體溫升高、視幻覺、情緒不穩、記憶減退、失眠及妄想等。長期使用造成神經系統傷害。 2. 戒斷症狀：憂鬱、全身無力、焦慮易怒。
液態快樂丸/G水	口服 (無臭無味、易溶於水)	1. 噁心嘔吐、呼吸困難、尿失禁、失去意識甚至死亡，與酒精併用會增加危險性。 2. 戒斷症狀：失眠、焦慮、顫抖、流汗。

## 二、什麼是成癮？

成癮的特徵是會產生強烈使用毒品慾望，進而改變其精神狀態。「癮」通常伴隨劑量增加和生理、心理依賴性。成癮者通常有以下特徵：

- (一) 無法停止使用且越用越多：心理有強烈渴望，整天都想要且持續增加用量。
- (二) 停止使用會出現戒斷症狀：長期或過量使用毒品若減量或停止會發生戒斷症狀。
- (三) 影響工作：上述症狀持續一個月以上會產生社會與職業功能傷害。
- (四) 為了獲得毒品花費許多時間及代價。
- (五) 可能反覆使用，即使身癮解除，心癮仍難以戒除。

國立成功大學醫學院附設醫院

成癮戒治門診 關心您

電話：06-2353535 分機 4362

資料來源：

[反毒大本營](https://antidrug.moj.gov.tw/lp-1214-1-1-40.html)

(<https://antidrug.moj.gov.tw/lp-1214-1-1-40.html>)